

# SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LINFOMA DE CÉLULAS DE MANTO

Los pacientes con LCM pueden presentar una enfermedad de ritmo lento que se puede observar durante **meses o años sin tratamiento**, mientras que otros tienen un linfoma muy agresivo.


## Síntomas más frecuentes:<sup>1</sup>



Fiebre y sudoración nocturna.



Nauseas y vómitos.




Hematomas y sangrados inusuales.



Malestar por agrandamiento de las amígdalas.




Ganglios linfáticos inflamados.



Fatiga por anemia.




Falta de apetito y pérdida de peso.




Diarrea, indigestión.




Dolor y sensación de estómago lleno.



Dolor e inflamación abdominal.



Inflamación del bazo.



Presión o dolor en la zona lumbar que se extiende hacia abajo.

**\*MIPI= índice pronóstico internacional de linfoma de células del manto**

Referencias:

1. Linfoma de las células del manto. Disponible en: [https://www.lls.org/sites/default/files/file\\_assets/FS4S\\_SP\\_MCL\\_Facts\\_Rev.pdf](https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS4S_SP_MCL_Facts_Rev.pdf). Accesado en noviembre 2023.

Realizado por AstraZeneca CAMCAR Costa Rica S.A. Roble Corporate Center, 5to piso, Escazú, San José, Costa Rica, teléfono: (506) 2201 3400, apartado postal: 993-1260 Escazú. [www.camcar.astrazeneca.com](http://www.camcar.astrazeneca.com) para AstraZeneca CAMCAR S.A. Para reporte de eventos adversos, quejas de calidad o información médica, visite <https://www.contactazmedical.astrazeneca.com>. Material Exclusivo para profesionales de la salud. CC-11115 / NOV2025