

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

Algunos pacientes con LLC no presentan síntomas en el momento del diagnóstico y su patología solo se puede descubrir después de la **detección de linfocitosis en un análisis de sangre de rutina¹**

Síntomas más frecuentes:




Ganglios linfáticos inflamados (linfadenopatía).



Debilidad o cansancio de forma repentina.




Sudores nocturnos abundantes.



Anemia.




Pérdida de peso involuntaria.




Trombocitopenia.



Fiebre sin infección (más de 38°C).



Agrandamiento del bazo (esplenomegalia).



Hígado agrandado (hepatomegalia).

Referencias:
1. Kipps TJ et al. Chronic lymphocytic leukaemia Nat Rev Dis Primers. 2017; 3:16096. DOI: 10.1038/nrdp.2016.96

Realizado por AstraZeneca CAMCAR Costa Rica S.A. Roble Corporate Center, 5to piso, Escazú, San José, Costa Rica, teléfono: (506) 2201 3400, apartado postal: 993-1260 Escazú. www.camcar.astrazeneca.com para AstraZeneca CAMCAR S.A. Para reporte de eventos adversos, quejas de calidad o información médica, visite <https://www.contactazmedical.astrazeneca.com>. Material Exclusivo para profesionales de la salud. CC-11116 / OCTUBRE 2025