

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE PULMÓN

Es el **2º cáncer más común** que afecta tanto a hombres como a mujeres.



Alrededor del **13%** de todos los **cánceres nuevos** son cánceres de pulmón.

El cáncer de pulmón es por mucho la causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, representando casi un **25%** de todas las **muertes por cáncer**.

La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tiene **65 años o más**; sin embargo un número muy pequeño de personas diagnosticadas tienen **menos de 45 años**.¹

Este cáncer puede **iniciar en cualquier parte de los pulmones** o de las vías respiratorias.

- Si el cáncer de pulmón se descubre en una **etapa más temprana** (cuando es pequeño y antes de que se propague fuera de los pulmones), es más probable que se pueda tratar eficazmente.^{1,2}
- Para pacientes en estadios tempranos, la **intención curativa** debe ser el estándar de tratamiento.



Incidencia cáncer de pulmón Centroamérica y Caribe 2020



Referencias:
American Cancer Society. Cáncer de pulmón. 2019. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon/acerca/que-es-cancer-de-pulmon.html>. CDC. Cáncer de pulmón. 2021. Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/lung/basic_info/
Realizado por AstraZeneca CAMCAR Costa Rica S.A. Roble Corporate Center, 5to piso, Escazú, San José, Costa Rica, teléfono: (506) 2201 3400, apartado postal: 993-1260 Escazú. www.camcar.astrazeneca.com para AstraZeneca CAMCAR S.A. Para reporte de eventos adversos, quejas de calidad o información médica, visite <https://www.contactazmedical.astrazeneca.com>. Material Exclusivo para profesionales de la salud. CC-11118 / OCT2025