Cáncer de pulmón



La mayoría de los cánceres de pulmón solo causan síntomas cuando ya se han propagado

¿Cómo saber si tengo riesgo de padecer cáncer de pulmón? [1]

¿Tengo entre 50 y 80 años? ◯ Si ◯ No

¿He tenido algunos de los siguientes síntomas?

- ◯ Tos que no desaparece o empeora.
- ◯ Tos con sangre o saliva/flema color metal oxidado.
- ◯ Dolor en el pecho.
- ◯ Pérdida de peso inexplicable.
- ◯ Bronquitis crónica.
- ◯ Ronquera.
- ◯ Dificultad para respirar.

¿Cuál es mi hábito de fumado?

- ◯ Fumo actualmente.
- ◯ Fumé en los últimos 15 años.
- ◯ Fumé un paquete al día por 30 años.
- ◯ Tengo un historial de 30 o más "paquetes - año".

Paquetes - año: _____ N° años fumando X _____

paquetes diarios (1 paquete= 20 cigarrillos)

Si responde SI a las 3 preguntas, debe consultar con un médico para determinar si requiere más pruebas para la detección de cáncer de pulmón.

Una detección temprana y oportuna puede salvarle la vida [1]

Referencia: 1. Lung cancer early detection. Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/detection-diagnosisstaging/detection.html Accesado en octubre 2023.

Este contenido no hace parte de un consejo médico ni un diagnóstico clínico. Esta es información preventiva diseñada para que la comparta con médico. NO DEJE O CAMBIE su medicación sin consultar con un profesional de la salud. Consulte siempre a su médico antes de tomar cualquier decisión relacionada con su salud. Realizado por AstraZeneca CAMCAR Costa Rica S.A. Roble Corporate Center, 5to piso, Escazú, San José, Costa Rica, teléfono: (506) 2201 3400, apartado postal: 993-1260 Escazú. www.camcar.astrazeneca.com para AstraZeneca CAMCAR S.A. Para reporte de eventos adversos, quejas de calidad o información médica, visite https://www.contactazmedical.astrazeneca.com CC-10741/Octubre 2025.

AstraZeneca