

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PULMÓN

Todo paciente con sospecha por cáncer de pulmón **debe ser referido** directamente a los especialistas de neumología o cirugía torácica si los síntomas persisten por más de tres semanas.

Síntomas más frecuentes:



Tos persistente.



Dolor torácico.




Hemoptisis.



Disnea.



Pérdida de peso significativa.



Hipocratismo digital.



Disfonia.



Linfadenopatía cervical o supraclavicular.



Estridor.



Síndrome de obstrucción de vena cava superior.



Signos sugestivos de metástasis (cerebro, huesos, hígado o piel).

***Uno o más de la lista**

Referencias:
American Cancer Society. Cáncer de pulmón. 2019. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon/acerca/que-es-cancer-de-pulmon.html> CDC. Cáncer de pulmón. 2021. Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/lung/basic_info/
Realizado por AstraZeneca CAMCAR Costa Rica S.A. Roble Corporate Center, 5to piso, Escazú, San José, Costa Rica, teléfono: (506) 2201 3400, apartado postal: 993-1260 Escazú. www.camcar.astrazeneca.com para AstraZeneca CAMCAR S.A. Para reporte de eventos adversos, quejas de calidad o información médica, visite <https://www.contactazmedical.astrazeneca.com>. Material Exclusivo para profesionales de la salud. CC-11118 / OCT2025